

殺虫 & 被害防止 種まき後・植え付け後に そのまま 株元にまくだけ 粒タイプ
 一晩で効く 秋野菜 にもおすすめ 野菜や花を 土の中に潜むネキリムシから守る
 誘い出し、食べさせて退治 43 作物に使える *

ネキリベイト®

<ペルメトリン粒剤>

有効成分：ペルメトリン・・・0.10%

[3-フェノキシベンジル=(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート]

農林水産省登録:第 23683 号

性状:淡赤色粒状 径 3mm 長さ 3~10mm

有効年限:4 年

容量:600g

* 適用作物名数

(ネキリベイトは住友化学園芸(株)の登録商標)

特長

- 株元にばらまくだけで土の中に潜むネキリムシを誘い出し、食べさせて退治します。
- 効果は速効性で、植え付け後や発芽後の作物を害虫から守るので、被害防止に有効です。

効果・薬害等の注意

- つまみ菜、間引菜には使用しないでください。
- 作物体上から作物の地際の表面に散布してください。
- 使用量、使用時期、使用方法などを守ってください。本剤を適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病虫害防除所または販売店と相談することが望ましいです。

安全使用上の注意

- 体調のすぐれない時は散布しないでください。
- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。使用中に身体に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布時は、マスク、手袋などを着用してください。粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。
- 蚕に長期間毒性があるので、付近に桑園がある所では使用しないでください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 使用後の空容器は良くたいたいで中身を完全に出してから処理してください。

治療法:メトカルバモール製剤の投与が有効(動物実験で報告)。

適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数を示す。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
花き類・観葉植物	ネキリムシ類	3g/m ²	生育初期	6回以内	株元散布
はくさい、ごぼう			は種時～生育初期	5回以内	
だいこん				4回以内	
オクラ			3回以内		
キャベツ、レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ピーマン、いちご、たまねぎ、かんしょ、やまのいも、さといも、かぼちゃ			生育初期	5回以内	
なばな類、ねぎ、わけぎ、あさつき、豆類(未成熟)、そらまめ、だいず、なす、きゅうり、トマト				3回以内	
ミニトマト				1回	
とうもろこし、ばれいしょ			4回以内		
ほうれんそう、しゅんぎく			2回以内		
にんじん			5回以内		
もりあざみ			3回以内		
エンサイ			生育初期 但し収穫14日前まで	2回以内	
葉しょうが			生育初期 但し収穫30日前まで	4回以内	
しょうが			定植時～発芽期 但し 収穫120日前まで		
エンダイブ			定植時 但し収穫21日前まで	2回以内	
かぶ			収穫3日前まで	4回以内	
にら、にら(花茎)				3回以内	
アスパラガス、パセリ				収穫前日まで	
とうがらし類			収穫開始7日前まで	2回以内	

- 本剤40粒(長さ3~10mm位のもの)で約1gです。散布は一カ所に集中せず均一に散布するとより効果的です。