

6 カ月 * 雑草を生やさない 深い根まで枯らす

枯らしにくい雑草にも

セイタカアワダチソウ・スギナ・カタバミ・ヤブガラシ

草退治メガロング® シャワー

有効成分：ヘキサジノン.....0.40%

[3-シクロヘキシル-6-ジメチルアミノ-1-メチル-1, 3, 5-トリアジン-2, 4(1H, 3H)-ジオン]

農林水産省登録:第 23727 号

性状:無色透明水溶性液体

有効年限:5 年

容量:2L入

(メガロングは住友化学園芸(株)の登録商標)

特長

抜群の除草効果:しつこい雑草の深い根までしっかり枯らす。

すばやい効きめ:散布後2~7 日で枯れ始める。

シャワータイプで効果持続:シャワーの手軽さに、6 カ月 * の持続性をプラス！

* 最大散布量を散布した場合の刈り取り不要最長期間の目安で、雑草が全く発生しないということではありません。持続期間は土壌条件、気象条件によって変動します。

効果・薬害等の注意 **ハウス内禁止**

- 一年生雑草に低薬量で使用する場合、雑草の茎葉にしっかりかかるように注意して散布してください。
- 雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、生育期(草丈 30cm 以下)に使用してください。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれがある場所等では使用しないでください。
- 植栽地(農地を含む)または有用植物に飛散しないよう十分注意してください。
- 植物の根から吸収されると薬害が発生するので、水田や水田への利用が考えられる用水路等に流入が想定される場所や、農作物および樹木等有用植物の付近では使用しないでください。
- 激しい降雨が予想される場合は使用しないでください。
- ハウス等の施設内およびその周辺、作物のは種または植栽予定地では使用しないでください。
- 傾斜地や砂質土壌では、流出による薬害のおそれがあるので使用しないでください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は病害虫防除所または販売店と相談することが望ましいです。

安全使用上の注意 **マスク着用** **塗装注意**

- 体調のすぐれない時は散布しないでください。
 - 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください(弱い刺激性)。
 - 使用量に合わせ秤量し使いきってください。
 - 散布時は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
 - 駐車場、道路等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
 - 桑葉にかからないようにしてください(蚕毒)。
 - 水源池、養殖池等に飛散・流入しないよう十分注意してください。
 - 飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう3回以上洗浄してから適切に処理してください。
- 魚毒性等**:河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(藻類)。
- * 最大散布量を散布した場合の刈り取り不要最長期間の目安で、雑草が全く発生しないということではありません。持続期間は土壌条件、気象条件によって変動します。

適用雑草と使用方法

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬を年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数 *	使用方法
樹木等	駐車場 道路 運動場 宅地等	一年生雑草	雑草生育期 (草丈 30cm以下)	10～80ml／㎡ (原液散布)	2回以内	植栽地を除く樹木等の 周辺地に雑草茎 葉散布兼全面土壌 散布
		多年生雑草		40～80ml／㎡ (原液散布)		

[上手な散布の仕方]

- キャップを開け、雑草が生えている場所にそのまま散布します。
- 草丈が30cm以下の雑草生育期に散布すると効果的です。
- 一年生雑草では10～40ml／㎡を茎葉に散布してください。
- 一年生雑草及び多年生雑草を枯らし、雑草を予防するには40～80ml／㎡を茎葉と土壌に散布してください。
- 本剤は茎葉に散布するだけでなく、土壌にも散布することで有効成分が留まり効果が持続します。

散布液が出にくい場合は、ボトル側面を軽く押してください。

[注意]

- 有用植物も枯らします。
- 空き地、駐車場など、有用植物の植栽地に薬剤が流入するおそれがない場所で使用してください。
- 樹冠下や根の張っている範囲、砂質土壌、激しい降雨が予想される時は使用しないでください。
- 樹木(マツ、サクラ、ムクゲ等)、草花、庭木、芝生、菜園、果樹、水田(休耕田含む)などの枯らしたくない植物の周り、有用植物の植栽地に薬剤が流入するおそれがある場所、傾斜地では絶対に使用しないでください。根から吸収されると薬害により植物が枯れます。
- 芝生には使用できないでください。
- 土壌条件、気象条件(晩秋～春先の低温時、散布後すぐに雨が降るなど)によっては、効果にむらが生じる場合があります。
- 雑草の中には枯れにくい種類もあります。
- 他の液を入れて使用しないでください。

適用雑草名	本剤2L1本で散布できる面積
一年生雑草	25～200㎡ (約7. 6～60. 6坪)
多年生雑草	25～50㎡ (約7. 6～15. 1坪)

枯れ始めるまでの日数	2～7日
効果持続の目安	約6ヵ月 *